



INFORMATION GÉNÉRALE

- 1) Il est recommandé de prélever 3 spécimens consécutifs;
- 2) Pour les cas symptomatiques, 1 prélèvement peut être suffisant;
- 3) Le prélèvement doit se faire avant de se laver. Il est recommandé d'effectuer la procédure quelques heures après le coucher ou le matin au lever, avant les selles.

FOURNITURES MÉDICALES

- Une lame de verre givré pour chaque prélèvement.
- Une bande de ruban adhésif clair pour chaque prélèvement (largeur approximative d'une lame de verre).
- 1 étui à lame pour chaque lame.
- Gants.
- D'autres trousse de prélèvement peuvent être utilisées (confirmer avec le laboratoire).
- Sac biorisque;
- Stabilité :
- 24 heures à température ambiante entre 18 et 25 °C

PRÉLÈVEMENT

- 1) Lavez vos mains avec de l'eau et du savon. Portez les gants protecteurs avant le prélèvement;
- 2) Séparez vos fesses et appuyer la surface collante du ruban adhésif contre différents endroits de la région anale.
- 3) Appliquez la région collante de la bande sur la lame de verre.
- 4) Identifiez la lame sur la partie givrée en utilisant un crayon de plomb et en indiquant les informations qui suivent :
 - Prénom et nom de famille;
 - Date de naissance ou numéro d'assurance maladie;
 - Date et heure du prélèvement.
- 5) Placez la lame dans l'étui à lame.
- 6) Placez l'étui dans le sac biorisque.
- 7) Retournez l'échantillon à votre médecin ou au laboratoire dans les plus brefs délais