

FOURNITURES MÉDICALES

- Contenant d'urine stérile;
- Sacs biorisque;
- La première urine du matin est recommandée pour ce test car certains composés doivent incuber au moins 4 heures dans la vessie.
- Pour les femmes: aviser votre médecin si vous êtes dans votre période menstruelle.
- Stabilité¹:
 - 2 heures à température ambiante entre 18 et 25 °C
 - 6 à 8 heures réfrigéré entre 2 et 8 °C

PRÉLÈVEMENT

- 1) Lavez vos mains avec de l'eau et du savon.;
- 2) Ouvrir le contenant stérile;
- 3) Commencez à uriner dans la cuvette des toilettes et arrêtez.
- 4) Urinez ensuite dans le contenant stérile. Un volume d'au moins 15 mL est nécessaire pour l'analyse. Si besoin est, éliminez le reste de vos urines dans les toilettes;
- 5) Refermez le contenant hermétiquement.
- 6) Identifiez le contenant:
 - Prénom, nom de famille
 - Date de naissance ou numéro d'assurance maladie
 - Date et heure du prélèvement
- 7) Retournez le contenant immédiatement à votre médecin ou au laboratoire.

¹ Transport et conservation de spécimens dans le domaine de la biologie médicale, OPTMQ, troisième édition, 2003, p.8