

FOURNITURES MÉDICALES

- Contenant propre (un contenant stérile peut aussi être utilisé);
- Sac biorisque;
- Stabilité¹ :
- 24 heures réfrigéré entre 2 et 8 °C

PRÉPARATION

Évitez de prendre des laxatifs ou des antibiotiques une semaine avant le prélèvement sauf si votre médecin le recommande. Ne faites pas de lavement rectal durant la semaine précédant le prélèvement.

PRÉLÈVEMENT

- 1) S'assurer que les selles soient dans un pot de chambre, dans un sac de plastique, sur une pellicule de plastique commerciale (ex : Saran rap) ou sur un papier journal propre et sec, selon ce qui convient le mieux. Il ne doit pas y avoir d'urine dans les selles.
- 2) Ouvrir le contenant;
- 3) Prélever de petites portions de chaque côté et au milieu des selles en utilisant la spatule fournie avec le kit.
- 4) Portez une attention particulière à cette étape et prélevez des échantillons sur divers endroits des selles qui contiennent du mucus ou du sang. La spatule remplie équivaut à une cuillerée et cela est suffisant pour effectuer l'analyse.
- 5) Fermez le contenant hermétiquement;
- 6) Identifiez le contenant:
 - Prénom, nom de famille
 - Date de naissance ou numéro d'assurance maladie
 - Date et heure du prélèvement.
- 7) Retournez le contenant immédiatement, soit à votre médecin soit au laboratoire.

Note : Un seul échantillon est suffisant pour poser un diagnostic. Si trois échantillons sont demandés, prélever trois échantillons de selles consécutives et les acheminer au fur et à mesure au laboratoire.

¹ Transport et conservation des spécimens dans le domaine de la biologie médicale, OPTMQ, troisième édition, 2003, p.41.